

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Махова Нелли Семёновна

Юр. адрес: 655017 Россия Республика Хакасия
г. Абакан ул. Карла Маркса дом 63 пом. 87Н

Адрес филиала: 680021 Россия г.Хабаровск,
ул. Серьшева д.72, пом.1/1в

«13» апреля 2026 г.

ИНФОРМАЦИЯ

**О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ
ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА, ИЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СТАНОВЯТСЯ
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.**

Номер результат оказания медицинских услуг, выполнения работ	правила, условия сохранения эффективно го и безопасного результата лечения	Гарантийный срок на достигнутый лечебный результат	Необходимые действия по истечению гарантийного срока результата лечения	возможные последствия бездействия при истечении гарантийного срока результата лечения	
1	Микропенная склеротерапия, микросклеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры,	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	увеличение количества ТАЭ, внутрикожных ретикулярных вен

		ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья.			
2	Стволовая склеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 1*
3.	ЭВЛК	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников. Соблюдение лечебно-	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*

		охранительного режима в послеоперационном периоде			
4	«Тотал» - ЭВЛК	Исключение посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников. Соблюдение лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*
5	Минифлебэктомия	Исключение посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников. Соблюдение лечебно-охранительного режима в	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*

послеоперац
ионном
периоде

Примечание 1*

- гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- неврологические нарушения: мигреноподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- симптоматический тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия с вероятным развитием летального исхода.

Примечание 2*

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
- Воспаление подкожных вен, лимфоррея и лимфоцеле;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематомы;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоэмболизма, летального исхода.